

# Demonstratii in logica predicatelor

# Reguli pentru cuantificatori

- Pentru demonstratii in logica predicatelor, folosim toate regulile din cadrul demonstratiilor din logica propozitiilor.
- In plus, avem reguli de introducere si de eliminare pentru fiecare din cei doi cuantificatori.
- Pe langa regulile de inlocuire din cadrul logicii propozitiilor, adaugam si unele specifice logicii predicatelor legate de negarea cuantificatorilor.

# Eliminarea cuantificatorului universal

- Dacă stim  $\forall x p(x)$  adevărat, este normal să ne gândim că  $p$  este adevărat pentru orice.
  - Putem deduce  $p(a), p(b), p(c), p(a37), p(b89), \dots$
  - Se poate deduce  $p(c)$  pentru orice constantă  $c$ .

$$m \quad \left| \begin{array}{l} \forall x P \\ P[c/x] \quad \forall E \ m \end{array} \right.$$

- $P[c/x]$  este o instanță de substituție pentru  $P$ , adică variabila  $x$  este înlocuită peste tot în  $P$  de constantă  $c$ .
- Cu  $P$  am notat orice formulă bine formată din logica predicatelor.

# Eliminarea cuantificatorului universal

- Ex:

1	$\forall x(p(x) \rightarrow r(x, d))$	
2	$p(a) \rightarrow r(a, d)$	$\forall E\ 1$
3	$p(d) \rightarrow r(d, d)$	$\forall E\ 1$

# Introducerea cuantificatorului existential

- Cand putem deduce  $\exists x p(x)$ ?
  - Daca stim ceva legat de predicatul  $p$ , de ex avem  $p(c)$  disponibil in demonstratie.

$$\begin{array}{c} m \\ \hline P \\ \exists x P[x||c] \quad \exists I m \end{array}$$

- $P[x||c]$  nu este o substitutie.
- Prin  $P[x||c]$  intelegem ca variabila  $x$  nu trebuie sa inlocuiasca peste tot constanta  $c$ .
  - Putem alege ce aparitii sa fie inlocuite si care sa fie lasate cum erau.

# Introducerea cuantificatorului existential

- Ex:

1	$p(a) \rightarrow r(a, d)$	
2	$\exists x(p(a) \rightarrow r(a, x))$	$\exists I 1$
3	$\exists x(p(x) \rightarrow r(x, d))$	$\exists I 1$
4	$\exists x(p(x) \rightarrow r(a, d))$	$\exists I 1$
5	$\exists x\exists y(p(x) \rightarrow r(y, d))$	$\exists I 1$
6	$\exists x\exists y\exists z(p(x) \rightarrow r(y, z))$	$\exists I 1$

# Introducerea cuantificatorului universal

- O afirmatie precum  $\forall x p(x)$  poate fi dovedita daca fiecare substitutie posibila ( $p(a)$ ,  $p(b)$ , ...) ar fi dovedita anterior.
- Exista o infinitate de constante in logica predicatelor, deci nu pot sa apara toate in demonstratie anterior.
- Cum se poate demonstra ca:

$$\frac{\forall x p(x)}{\forall y p(y)}$$

# Introducerea cuantificatorului universal

$$\frac{\forall x p(x)}{\forall y p(y)}$$

- Nu are nicio importanta pentru propozitie daca folosim variabila x sau variabila y.

1		$\forall x p(x)$	vrem $\forall y p(y)$
2		$p(a)$	$\forall E 1$

- La fel, putem deduce  $p(b)$ ,  $p(c)$ ,  $p(a_32)$ , ...
- Se poate asadar deduce  $p(c)$  pentru orice constanta c.
  - Din aceasta, ne rezulta  $\forall y p(y)$ .



# Introducerea cuantificatorului universal

$$\frac{\forall x p(x)}{\forall y p(y)}$$

- Este important de observat ca  $a$  este o constanta aleasa arbitrar.
  - Daca  $p(a)$  era o premisa, nu puteam deduce ceva despre orice  $y$ .

1	$\forall x p(x)$	vrem $\forall y p(y)$
2	$p(a)$	$\forall E$ 1
3	$\forall y p(y)$	$\forall I$ 2

# Introducerea cuantificatorului universal

- Contraexemplu:

1		$\forall x p(x, a)$	
<hr/>			
2		$p(a, a)$	$\forall E\ 1$
3		$\forall y p(y, y)$	<b>NU ESTE CORECT!</b>

- Trebuie sa luam o constanta care nu mai apare in cadrul demonstratiei.

# Introducerea cuantificatorului universal

1		$\forall x p(x, a)$	
<hr/>			
2		$p(a, a)$	$\forall E 1$
3		$\forall y p(y, y)$	<b>NU ESTE CORECT!</b>

- Trebuie sa luam o constanta care nu mai apare in cadrul demonstratiei.

1		$\forall x p(x, a)$	
<hr/>			
2		$p(b, a)$	$\forall E 1$
3		$\forall y p(y, a)$	$\forall I 2$

CORECT

# Introducerea cuantificatorului universal

- Constanta poate insa aparea in presupunerea unei subdemonstratii.
- De exemplu, se poate dovedi  $\forall x(p(x) \rightarrow p(x))$  fara nicio premisa.

1			p(c)	
			-----	
2			p(c)	R1
3		p(c) → p(c)		→ I 1-2
4		$\forall x(p(x) \rightarrow p(x))$		$\forall$ I 3

# Eliminarea cuantificatorului existential


- O propozitie cu un cuantificator existential ne spune ca exista vreun element din univers care satisface formula.
- De exemplu,  $\exists x p(x)$  ne spune ca exista cel putin un element care il face pe  $p$  adevarat, dar nu stim care element din  $U$ .
- Daca stim  $\exists x p(x)$  si  $\forall x (p(x) \rightarrow q(x))$ , avem urmatorul rationament:
  - Exista un "c" pentru a avea  $p(c)$  adevarat.
  - Din  $\forall x (p(x) \rightarrow q(x))$  obtinem ca si  $q(c)$  este adevarat, adica...

$$\exists x q(x)$$

# Eliminarea cuantificatorului existential

1	$\exists x p(x)$	
2	$\forall x(p(x) \rightarrow q(x))$	vrem $\exists x q(x)$
3	$p(a)$	
4	$p(a) \rightarrow q(a)$	$\forall E$ 2
5	$q(a)$	$\rightarrow E$ 3, 4
6	$\exists x q(x)$	$\exists I$ 5
7	$\exists x q(x)$	$\exists E$ 1, 3-6

# Eliminarea cuantificatorului existential



- \* Constanta c nu apare in  $\exists xP$ , in Q sau in orice alta parte a demonstratiei.

# Negarea cuantificatorilor

1	$\forall x p(x)$	vrem $\neg \exists x \neg p(x)$
2	$\exists x \neg p(x)$	RA
3	$\neg p(c)$	Pt $\exists E$
4	$\forall x p(x)$	RA
5	$p(c)$	$\forall E$ 4
6	$\neg p(c)$	$R_3$
7	$\neg \forall x p(x)$	$\neg I$ 4-6
8	$\neg \forall x p(x)$	$\exists E$ 2, 3-7
9	$\forall x p(x)$	$R_1$
10	$\neg \exists x \neg p(x)$	$\neg I$ 2-9



# Negarea cuantificatorilor

- Am aratat ca pornind de la  $\forall x p(x)$  se ajunge la  $\neg \exists x \neg p(x)$ .
  - Pentru a arata ca cele doua sunt echivalente, trebuie sa pornim de la cea de a doua sa ajungem la prima.
- In demonstratii, vom putea folosi in continuare urmatoarele doua reguli de inlocuire de la Negarea Cuantificatorilor (notate cu NC)
- $\neg \forall x p(x) \equiv \exists x \neg p(x)$
- $\neg \exists x p(x) \equiv \forall x \neg p(x)$

# Concepte legate de teoria demonstratiilor

- Pentru a indica faptul ca o demonstratie este posibila, vom folosi simbolul  $\vdash$ .
  - $A$  nu se confunda cu simbolul  $\models$  pe care l-am folosit pentru deductia propozitiilor.
- $\{A_1, A_2, \dots\} \vdash B$  inseamna ca putem da o demonstratie pentru  $B$  avand  $A_1, A_2, \dots$  drept premise.
- $A \vdash B$  inseamna ca exista o demonstratie a lui  $B$  cu  $A$  drept premisa.
- $\vdash B$  inseamna ca exista o demonstratie a lui  $B$  care nu are premise.

# Concepte legate de teoria demonstratiilor

- De multe ori, demonstratiile logice se mai numesc si **derivari**.
- Deci  $A \vdash B$  poate fi citita si ca "B este derivabil din A".
- O **teorema** este o propozitie care este derivabila fara nicio premisa.
  - Adica  $T$  este o teorema daca si numai daca  $\vdash T$ .
- Pentru a arata ca o propozitie este teorema trebuie sa dam o demonstratie a acesteia.
- Dar cum putem arata ca ceva nu este o teorema?
  - Daca negatia sa este o teorema, atunci problema este rezolvata.

# Concepte legate de teoria demonstratiilor

- Dar pentru o propozitie care nu este nici teorema, nici negatia unei teoreme ar trebui sa aratam ca nicio demonstratie nu e posibila.
- Doua propozitii  $A$  si  $B$  sunt **demonstrabil echivalente** daca si numai daca fiecare poate fi derivata din cealalta.
  - Adica  $A \vdash B$  si  $B \vdash A$ .
- Pentru a demonstra ca doua propozitii sunt demonstrabil echivalente, avem nevoie doar de o pereche de demonstratii.
- Insa a arata ca doua propozitii nu sunt demonstrabil echivalente e la fel de dificil precum a arata ca o propozitie nu este teorema.

# Concepte legate de teoria demonstratiilor

- O multime de propozitii  $\{A_1, A_2, \dots\}$  este **demonstrabil inconsistentă** dacă și numai dacă se poate deriva o contradicție din aceasta.
- Adică, având propoziția  $B$ ,  $\{A_1, A_2, \dots\} \vdash B$  și  $\{A_1, A_2, \dots\} \vdash \neg B$ .
- Pentru a arăta că o multime este demonstrabil inconsistentă, trebuie să ne asumăm propozițiile din multime și să demonstrăm o contradicție.
- Pentru a arăta însă că o multime nu este demonstrabil inconsistentă ar necesita a dovedi că demonstrațiile de un anumit tip sunt imposibile.

# Demonstratii si modele

- Insa exista o conexiune intre **teoreme** si **tautologii**.
- Exista un mod formal de a arata ca o propozitie este o teorema: prin demonstratie.
- Pentru a arata insa ca o propozitie este o tautologie ar fi necesar un rationament in limbaj natural asupra tuturor modelelor posibile.
- Nu exista un mod formal de a verifica ca rationamentul este corect.
- Daca putem alege intre a arata ca o propozitie este o teorema sau ca este o tautologie, ar fi mai usor de dovedit ca este o teorema.

# Demonstratii si modele

- Invers, nu exista un mod formal de a arata ca o propozitie nu este o teorema.
- Ar necesita un rationament in limbaj natural asupra tuturor demonstratiilor posibile.
- Cu toate acestea, exista o metoda formala pentru a arata ca o propozitie nu este o tautologie.
  - Trebuie doar sa construim un model in care propozitia este falsa.
- Daca putem face o alegere intre a arata ca o propozitie nu este o teorema sau ca nu este o tautologie, ar fi mai usor de dovedit ca nu este o tautologie.

# Demonstratii si modele

- Din fericire, avem conexiunea care precizeaza ca o **propozitie este o teorema daca si numai daca este o tautologie**.
- Daca dam o demonstratie pentru  $\vdash A$  si astfel aratam ca este o teorema, rezulta ca  $A$  este o tautologie, adica  $\models A$ .
- In mod similar, daca vom construi un model in care  $A$  este falsa si deci aratam ca nu este o tautologie, rezulta atunci ca  $A$  nu este o teorema.
- In general:  **$A \vdash B$  daca si numai daca  $A \models B$** .
- Un rationament este **valid** daca si numai daca **concluzia este derivabila din premise**.



# Demonstratii si modele

- Doua propozitii sunt **logic echivalente** daca si numai daca sunt **demonstrabil echivalente**.
- O multime de propozitii este **consistenta** daca si numai daca **nu este demonstrabil inconsistent**.
- Avand deci un rationament pe care il putem traduce in logica predicatelor:
  - Daca este valid din punct de vedere deductiv, atunci putem sa ii dam o demonstratie formala.
  - Daca este invalid, atunci putem da un contraexemplu formal.

# Demonstratii si modele

Intrebare	DA	NU
Este A o tautologie?	Demonstreaza $\vdash A$	Construieste un model in care A e falsa.
Este A o contradictie?	Demonstreaza $\vdash \neg A$	Construieste un model in care A e adevarata.
Este A contingenta?	Construieste doua modele, unul in care A este adevarata si altul in care este falsa.	Demonstreaza $\vdash A$ sau $\vdash \neg A$
Sunt A si B echivalente?	Demonstreaza $A \vdash B$ si $B \vdash A$	Construieste un model in care A si B au valori diferite de adevar.
Este multimea A consistenta?	Construieste un model in care toate propozitiile din A sunt adevarate.	Luand propozitiile din A, demonstreaza B si $\neg B$ .
Este deductia lui C din P valida?	Demonstreaza ca $P \vdash C$	Construieste un model in care P e adevarata si C falsa.

- **Ex. 1:** Dati o justificare (regula si numerele de linii) pentru fiecare linie de demonstratie care necesita una.

1	$\forall x(p(x) \rightarrow q(x))$										
2	$\exists x \forall y r(x, y)$										
3	$\forall x p(x)$										
4	$p(c)$										
5	$p(c) \rightarrow q(c)$										
6	$q(c)$										
7	<table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"><math>\forall y r(c, y)</math></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">8</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"><math>r(c, c)</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">9</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"><math>q(c) \wedge r(c, c)</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">10</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"><math>\exists x (q(x) \wedge r(x, x))</math></td> </tr> </table>		$\forall y r(c, y)$			8	$r(c, c)$	9	$q(c) \wedge r(c, c)$	10	$\exists x (q(x) \wedge r(x, x))$
	$\forall y r(c, y)$										
8	$r(c, c)$										
9	$q(c) \wedge r(c, c)$										
10	$\exists x (q(x) \wedge r(x, x))$										
11	$\exists x (q(x) \wedge r(x, x))$										

- **Ex. 2:** Dati o justificare (regula si numerele de linii) pentru fiecare linie de demonstratie care necesita una.

1	$\forall x(\exists y r(x, y) \rightarrow \forall z r(z, x))$
2	$r(c, d)$
<hr/>	
3	$\exists y r(c, y) \rightarrow \forall z r(z, c)$
4	$\exists y r(c, y)$
5	$\forall z r(z, c)$
6	$r(e, c)$
7	$\exists y r(e, y) \rightarrow \forall z r(z, e)$
8	$\exists y r(e, y)$
9	$\forall z r(z, e)$
10	$r(e, e)$
11	$\forall x r(x, x)$

# Demonstratii si modele

- **Ex. 3:** Dati o demonstratie pentru fiecare asertiune:
  - $\{\forall x(p(x) \leftrightarrow q(x)), p(a) \wedge \exists x r(x, c)\} \vdash \exists x q(x)$
  - $\forall x(p(x) \wedge q(t)) \vdash \forall x p(x) \wedge q(t)$
  - $\forall x \forall y p(x, y) \vdash \exists x p(x, x)$
  - $\{\forall x(p(x) \rightarrow q(x)), \exists x p(x)\} \vdash \exists x q(x)$
  - $\{q(a) \rightarrow \forall x(p(x) \leftrightarrow p(a)), p(a), \neg p(b)\} \vdash \neg q(a)$

# Demonstratii si modele

- **Ex. 4:** Simbolizati fiecare dintre urmatoarele rationamente in logica predicatelor si adaugati presupunerea aditionala "Exista un P". Demonstrati apoi ca formele suplimentare ale argumentelor sunt valide in logica predicatelor.
  - Din "Toti P sunt Q. Toti P sunt R." se deduce ca "Exista un Q care este R."
  - Din "Niciun Q nu este R. Toti P sunt Q" se deduce ca "Exista un P care nu este R."
  - Din "Toti Q sunt R. Toti P sunt Q." se deduce ca "Exista un P care este R."

# Demonstratii si modele

- **Ex. 5:** Aratati ca fiecare pereche de propozitii este demonstrabil echivalenta:
  - $\forall x(p(x) \rightarrow \neg q(x)), \neg \exists x(p(x) \wedge q(x))$
  - $\forall x(\neg p(x) \rightarrow q(c)), \forall x p(x) \vee q(c)$
- **Ex. 6:** Aratati ca fiecare din urmatoarele este demonstrabil inconsistent.
  - $\{p(c) \rightarrow q(d), q(d) \rightarrow p(c), q(d) \wedge \neg p(c)\}$
  - $\{\forall x(p(x) \rightarrow q(x)), \forall z(p(z) \rightarrow r(z)), \forall y p(y), \neg q(a) \wedge \neg r(b)\}$

# Demonstratii si modele

- **Ex. 7:** Pentru fiecare din urmatoarele perechi de propozitii:
  - Daca sunt logic echivalente in logica predicatelor, dati demonstratii pentru a arata aceasta.
  - Daca nu sunt, construiti un model in acest sens:
    - $\forall x p(x) \rightarrow q(c), \forall x(p(x) \rightarrow q(c))$
    - $\forall x \forall y \forall z p(x, y, z), \forall x p(x, x, x)$



# Demonstratii si modele

- **Ex. 8:** Pentru fiecare din urmatoarele argumente:
  - Daca este valid in logica predicatelor, dati o demonstratie.
  - Daca este invalid, construiti un model pentru a arata aceasta:
- Din  $\exists x(p(x) \wedge \neg q(x))$  se deduce  $\forall x(p(x) \wedge \neg q(x))$
- Din  $\forall x(p(x) \rightarrow q(c))$  si  $p(d)$  se deduce  $q(c)$
- Din  $\forall x(p(x) \rightarrow q(x))$  si  $\forall x(q(x) \rightarrow r(x))$  se deduce ca  $\forall x(p(x) \rightarrow r(x))$
- Din  $\exists x(p(x) \vee q(x))$ ,  $\forall x(p(x) \rightarrow r(x))$  se deduce ca  $\exists x(p(x) \wedge r(x))$